

Informacja dla pacjentów przeprowadzających immunoterapie w formie (SIT) szczepionki podskórnej

Celem immunoterapii jest zmniejszenie nadwrażliwości organizmu na substancje (alergeny) wywołujące dolegliwości alergiczne. Polega ona na dostarczaniu organizmowi w formie szczepionki odpowiednich dawek uczulającego alergenu w dokładnie zalecanych terminach. Dokładne przestrzeganie terminów szczepień to podstawa do osiągnięcia dobrych rezultatów.

Immunoterapia na alergeny całoroczne (np. roztocze kurzu domowego, jad owadów) trwa co najmniej 3 lata; w fazie początkowej szczepionka podawana jest w tygodniowych odstępach, dawka podtrzymująca z reguły w odstępach miesięcznych.

Immunoterapia przedsezonowa zalecana jest przy alergii na alergeny sezonowe (pyłki drzew, traw i chwastów). Obejmuje ona przynajmniej 7 szczepionek podawanych w tygodniowych odstępach przed rozpoczęciem sezonu pylenia i powtarzana jest przez 3 kolejne sezony.

Tylko dobra współpraca pacjenta z lekarzem pomoże osiągnąć dobre rezultaty.

WAZNE!!!

- Odstęp między szczepieniami 7-14 dni
- Odstęp do innego rodzaju szczepienia - 1 tydzień
- 24 godziny po szczepieniu unikaj wysiłku fizycznego
- Przed każdym szczepieniem poinformuj lekarza o wszelkich zdarzeniach medycznych, które wystąpiły po ostatnim szczepieniu oraz jak było ono tolerowane
- Przed każdym szczepieniem poinformuj lekarza o ewtl. infekcjach, astmie oraz wszelkiej zmianie w przyjmowaniu leków

Jeżeli w momencie szczepienia wystąpią dolegliwości alergiczne, następna dawka szczepionki zostanie odpowiednio dostosowana.

Możliwe działanie uboczne i komplikacje

Zadna terapia medyczna nie jest bez ryzyka; znane są następujące niepożądane działania uboczne:

- Często: swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk w okolicy wstrzyknięcia
- Rzadko: czerwone plamy i bąble pokrzywowe na ciele, kichanie, łzawienie, swędzące oczy, katar, swędzący skórny guzek w miejscu wstrzyknięcia (Granulom)
- Bardzo rzadko: ścisnięcie w gardle i problemy z oddychaniem, atak astmy, osłabienie, utrata świadomości, szok alergiczny.

W odpowiednim czasie podjęte środki pozwolą na uniknięcie poważnych skutków.

Większość powyższych objawów ubocznych i komplikacji występuje przeważnie w ciągu 30 minut po otrzymaniu szczepionki, dlatego też niezbędne jest, aby pacjent tak długo pozostał pod obserwacją lekarza, który wskaże miejsce przebywania oraz osobę u której należy się po 30 minutach odmeldować. Jeżeli dolegliwości wystąpią po opuszczeniu Allergiezentrum, należy natychmiast zawiadomić lekarza domowego lub pogotowie ratunkowe.

Szansa na wyleczenie

Czy terapia odniesie zamierzone rezultaty jest zależne od wielu czynników np. rodzaju alergenu czy współpracy pacjenta (compliance). Ok. 60-80% pacjentów regularnie przeprowadzających immunoterapie osiągnęło zadowalające rezultaty. Najlepsze rezultaty osiągnięte są przy alergii na jad owadów i pyłki, mniejsze na roztocze

kurzu domowego. W najkorzystniejszym przypadku objawy alergiczne mogą ustąpić zupełnie. Zwykle notuje się znaczne zmniejszenie dolegliwości i redukcję w przyjmowaniu leków.

W wypadku dodatkowych pytań odnośnie terapii, lekarz udzieli wszelkich dodatkowych informacji w rozmowie wyjaśniającej.

Nie mam żadnych dodatkowych pytań i zgadzam się na zaproponowane leczenie oraz na dalsze i dodatkowe procedury medyczne.

Data _____

Podpis pacjenta lub osoby sprawującej władzę rodzicielską _____

Podpis lekarza _____

Podpis jednego z rodziców potwierdza, że sprawuje on sam władzę rodzicielską lub że decyzja została podjęta za zgodą drugiego rodzica.

Dzieci poniżej 12 lat przychodzą do szczepienia tylko w towarzystwie osoby dorosłej.