

Wodorowy test oddechowy (H2)

Do diagnostyki nietolerancji pokarmowej:

nietolerancja laktozy	<input type="radio"/>
nietolerancja fruktozy	<input type="radio"/>
nietolerancja sorbitu	<input type="radio"/>
przerost bakteryjny (test glukozy)	<input type="radio"/>

WAŻNE! Wrodzona nietolerancja fruktozy jest przeciwwskazaniem do wykonania testu.

Przeciwwskazania do wykonania testu: zażywanie antybiotyków, kolonoskopia w ciągu ostatnich 4 tygodni

Przygotowanie pacjenta do badania:

- w przeddzień badania **od godz. 18:30** pacjent musi być na czczo, może jedynie pić wodę niegazowaną
- do godz. 18:30 nie należy spożywać produktów wzdymających, takich jak: cebula, czosnek, por, kapusta, jarzyny strączkowe (fasola) oraz produktów pełnoziarnistych,
- ostatni posiłek niezbyt obfity bez produktów mlecznych i owoców
- 12 godzin przed rozpoczęciem testu nie należy palić papierosów ani żuć gumy

Przebieg testu

W czasie badania będą pobierane próbki powietrza wydychanego przez pacjenta: pierwsza próbka na czczo, następne 4 pobrania po wypiciu roztworu określonego cukru w odstępach 30-minutowych (mierzone jest stężenie wodoru w wydychanym przez pacjenta powietrzu). Test trwa ok. 2,5 godz.

W czasie badania mogą wystąpić następujące dolegliwości:

nudności, bóle brzucha, wzdęcia, oddawanie nadmiernej ilości gazów, „przelewanie” w brzuchu, biegunka.

Pacjent został poinformowany o przebiegu testu i o ewentualnych dolegliwościach w czasie badania.

W wypadku niejasności, prosimy zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia.

W przypadku stwierdzonej nietolerancji zalecamy zasięgnięcie **porady dietetyka** w naszym ambulatorium (konieczna rezerwacja terminu). Przy podejrzeniu przerostu bakteryjnego wskazane jest podjęcie dalszej terapii u gastrologa.

Koszty (ceny ważne do 30.6.2023):

Test oddechowy (H2) € 80,- (inkl. 10% MwSt)

WAŻNE: prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe testy nie są objęte ubezpieczeniem i muszą być zapłacone prywatnie.

Data/podpis pacjenta _____