Etikett Patient:in

**Ulotka informacyjna - Test skórny na nietolerancję leków**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lek 1: | O Amoksycylina<br>O Penicylina<br>O _____ | Lek 2: | O Amoksycylina<br>O Penicylina<br>O _____ |

**Pani/Pana termin wizyty** dnia

1. lek: **1. termin (test, czas trwania ok. 2 godzin): _____**
   **2. termin (odczyt testu, czas trwania ok. 1 godziny): _____**

2. lek: **1. termin (test, czas trwania ok. 2 godzin): _____**
   **2. termin (odczyt testu, czas trwania ok. 1 godziny): _____**

**Przebieg testu**

Przy wykonywaniu testu skórnego na nietolerancję leku w celu wyjaśnienia przyczyn reakcji alergicznej wykonuje się

- podczas **pierwszego uzgodnionego terminu wizyty** test Pricka, test śródskórny i ewtl. test naskórkowy **(czas trwania ok. 2 godzin)**
- **kolejnego dnia** podczas 2. terminu wizyty końcowy odczyt i ocenę widocznej opóźnionej reakcji **(czas trwania ok. 1 godziny)**

**Prosimy pamiętać o następujących kwestiach**

- Jednego dnia można testować tylko jeden lek.
- Należy informować swojego lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
- W trakcie ciąży nie wykonuje się testów skórnych na nietolerancję leków.
- Proszę sprawdzić, czy na termin wizyty nie potrzebują Państwo nowego skierowania.
- Testowane miejsca muszą pozostawać suche i nie wolno ich wystawiać na działanie promieni słonecznych.
- W przypadku odklejenia plastra należy przymocować go dodatkową taśmą klejącą.
- Czasami w testowanym miejscu może pojawić się swędzenie. Mimo to nie należy się drapać ani smarować żadną maścią aż do chwili dokonania odczytu!
- Gdyby po dokonaniu końcowego odczytu w testowanych miejscach wystąpiło zaczerwienienie skóry lub inne zmiany (tzw. opóźnione reakcje), prosimy nas o tym niezwłocznie poinformować! (wysyłając też zdjęcie na adres office@allergiezentrum.at)
- Przez trzy dni przed wykonaniem testu nie wolno przyjmować żadnych antyhistaminowych tabletek/kropli/syropów.
- Przez siedem dni przed i podczas wykonywania testu skórnego na nietolerancję leków nie wolno stosować na przedramionach żadnych leków zawierających kortyzon czy zmieniających odporność miejscową (Elidel®, Protopic®).
- W przypadku dużych tatuaży na skórze przedramion wykonanie testu nie jest możliwe.
- Ponieważ przygotowanie do wykonania testu jest bardzo kosztowne, prosimy o odpowiednio wczesną informację o rezygnacji z terminu, jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na wizytę. Jeżeli nie otrzymamy odpowiednio wczesnej informacji o rezygnacji z terminu (co najmniej 1 tydzień przed wizytą), będziemy musieli naliczyć Państwu 50€ opłaty na pokrycie poniesionych kosztów.

Wien, _____._____._____
Data

_____
Podpis pacjenta lub upoważnionego opiekuna (w przypadku podpisu tylko jednego rodzica oświadcza on, że sprawuje wyłączną pieczę nad podopiecznym bądź działa za zgodą drugiego rodzica.)