

Važne informacije o subkutanoj imunoterapiji (SIT)

Cilj subkutane imunoterapije je smanjenje preosetljivosti na one supstance koje izazivaju alergijska oboljenja. Zasnovana je na ubrizgavanju pod kožu tačno odmerenih količina supstanci na koje ste alergični, u tačno određeno vreme.

Imunoterapija se sprovodi tokom cele godine (npr.: grinje kućne prašine, otrov insekata) ili predsezonski (polen). Ukupno trajanje terapije je obično 3 godine (5 godina za otrove insekata). Lekar će vam objasniti odgovarajući terapijski protokol (faza doziranja i održavanja) i dati vam ga.

Sledeće tačke su od najveće važnosti

- Intervali vakcinacije ne smeju biti kraći od 7 i ne duži od 14 dana u fazi povećanja doze (videti protokol terapije).
- Interval do drugih (zaštitnih) vakcinacija treba da bude najmanje nedelju dana.
- Bez neuobičajenog stresa 24 sata nakon vakcinacije.
- Pre svake vakcinacije obavestiti lekara o bilo kakvim zdravstvenim smetnjama (npr. infekcija, astma, ...) ili prijaviti promenu u uzimanju lekova.
- Preparat za vakcinu se čuva u frižideru i treba ga čuvati na temperaturi između 2 °C i 8 °C. Ne sme se zamrzavati ili izlagati temperaturi većoj od 30 °C. Transport se može obavljati na sobnoj temperaturi.
- Imajte na umu da deca mlađa od 14 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe prilikom vakcinacije.
- Molimo donesite recept u apoteku na dan izdavanja recepta i dogovorite prva (najmanje) 4 termina za vakcinaciju otprilike 4 nedelje nakon uzimanja recepta (idealno početak: drveće: septembar/oktobar, trave: januar, pelin/ambrozija: mart/april, kod Pollinexa po dva meseca kasnije).

Moguće neželjene pojave

- najčešće: otok, crvenilo i svrab na mestu injekcije
- retko: curenje iz nosa, kijanje, osip na koži, formiranje granuloma (čvorići na mestu vakcinacije)
- izuzetno retko: otežano disanje, loša cirkulacija, nesvest.

Pošto se ove komplikacije obično javljaju u prvih 30 minuta nakon vakcinacije, morate biti pod medicinskim nadzorom ovoliko dugo. Obavestite nas odmah ako imate tegoba u ovom periodu! Ako se ozbiljni simptomi jave nakon što ste napustili centar za alergije, morate odmah obavestiti svog lekara ili hitnu pomoć. Prema evropskim smernicama, za imunoterapiju protiv otrova insekata preporučuje se primena antihistaminika pre vakcinacije. U slučaju alergije na polen ili grinje, ova primena se može razmotriti i u slučaju prethodno postojećih lokalnih reakcija.

Saglasnost

Pročitao/la sam i razumeo/la informacije o mojoj alergijskoj bolesti i mogućnostima lečenja. Lekar me je obavestio o planiranoj imunoterapiji i pristajem na planirani oblik terapije i izabrani preparat. Dobio/la sam odgovore na pitanja u vezi sa lečenjem. Lekar me je obavestio o svim neželjenim efektima koji se mogu javiti i svestan/svesna sam da se uspešno izlečenje ne može predvideti sa potpunom sigurnošću. Ako se pojave neželjeni efekti, javiću se svom lekaru. Dodatne informacije mogu pronaći u uputstvima za upotrebu. Pored toga, lekar mi je i dalje dostupan kao osoba za kontakt. Potvrđujem da nemam više pitanja.

Beč, _____
Datum

Potpis pacijenta ili zakonskog staratelja (ako jedan roditelj potpisuje sam, on/ona potpisom izjavljuje da ima isključivo starateljstvo ili da postupa uz saglasnost drugog roditelja.)

Potpis lekara