

Važne informacije za pacijente o peč testu (epikutanom testu)

Vaš lični termin na dan (molimo označite odgovarajuću kombinaciju datum)

- Ponedjeljak, _____ sreda, _____ četvrtak, _____
- Utorak, _____ četvrtak, _____ petak, _____

Način testiranja

Za epikutani test za utvrđivanje alergijske reakcije

- se na **prvom dogovorenom terminu** na vaša leđa lepi flaster,
- koji se skida kod nas **posle 48 časova**,
- a **trećeg dana** (tri dana nakon početka testa) se očitava rezultat.

Obratite pažnju na sledeće stavke

- Molimo da vam leđa budu suva.
- Ne sunčajte se.
- Ako se flaster odlepi, pričvrstite ga dodatnim komadom lepljive trake.
- Ponekad se u testnom regionu javi svrab. Molimo vas da se i pored toga ne češete!
- Ako nakon konačnog očitavanja dođe do crvenila kože ili drugih promena na mestima testiranja (tzv. kasne reakcije), molimo vas da nas odmah obavestite o tome!
- Obucite staru odeću tokom dana testiranja, jer postoji mogućnost da se odeća isprlja.
- Nemojte koristiti lekove koji sadrže kortizon ili lokalne imunomodulatore (Elidel®, Protopic®) na velikoj površini na koju se lepe flasteri.
- Ako su leđa jako dlakava, obrijati se 1-2 dana pre testa.
- Test se ne može sprovesti ako postoje velike tetovaže kože na leđima.
- Želimo da istaknemo da u pojedinačnim slučajevima - posebno kod frizerskih supstanci - postoji mogućnost teške reakcije kože, čak do stvaranja ožiljaka.

Obavestite svog lekara o bilo kojim lekovima koje uzimate.